

# TRIAM RETARD

Antiinflamatorio esteroide de acción prolongada



**USO VETERINARIO**

## COMPOSICIÓN:

*Principio activo:* Triamcinolona Acetonida 6mg – *Excipientes:* c.s.p. 1 ml

## INDICACIONES:

En todos los procesos en los que esté indicada la terapia con glucocorticoides.

*Antiinflamatorio músculo-esquelético:* indicado en casos de dolor y claudicación asociadas con artritis aguda localizada o generalizada, así como artritis reumatoide, traumática, osteoartritis, periostitis, tendinitis, sinovitis, bursitis, miositis del equino.

*Antialérgico en dermatología:* indicado especialmente en alivio del prurito y la inflamación en dermatitis alérgicas, dermatitis agudas húmedas, eczema seco, urticaria, asma, sensibilidad al polen, otitis externa alérgica no complicada.

## ESPECIES DESTINADAS, ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

TRIAM RETARD se puede administrar por vía subcutánea, intramuscular, intraarticular e intrasinoval.

Equinos, caninos y felinos: 1 ml cada 30–60 Kg de p.v.

La frecuencia de administración es cada 7-15 días.

La dosis por vía intraarticular e intrasinoval dependerá del tamaño de la articulación a tratar y del criterio del médico veterinario actuante, sugiriéndose una dosis entre 1–3 ml. La dosis en estos casos se puede repetir a los 3-4 días.

## CONTRAINDICACIONES/EFFECTOS SECUNDARIOS:

La terapia con Triamcinolona Acetonida, así como con otros corticoides está contraindicada en animales con tuberculosis latente, úlcera péptica y síndrome de Cushing.

La presencia de tuberculosis activa, diabetes mellitus, osteoporosis, insuficiencia renal, predisposición a tromboflebitis, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, necesitan de un control muy cuidadoso para el uso de corticoides.

La administración intrasinoval u otra de efecto local está contraindicada en presencia de infecciones.

La exacerbación del dolor, pérdida del movimiento articular con fiebre y malestar, luego de la administración, puede indicar que la lesión se ha vuelto séptica. En este caso de instruirse una antibiótico-terapia adecuada.

El principio activo produce la inhibición de los mecanismos y de los cambios tisulares asociados con la inflamación. Disminuye la permeabilidad vascular y la exudación, así como la migración de las células inflamatorias. También se pueden ver suprimidas las manifestaciones sistémicas como la fiebre y signos de toxemia.

La supresión de la inflamación puede enmascarar los signos de infección y favorecer la proliferación de microorganismos.

Si ocurre una infección, se deben tomar medidas para el control de los microorganismos involucrados y determinar si se suspende la terapia a base de este producto. Sin embargo, en

infecciones caracterizadas por una toxicidad sistémica, la Triamcinolona asociada a un antibiótico terapia adecuada, puede ser beneficiosa para disminuir la morbilidad y mortalidad de la enfermedad.

No administrar en hembras preñadas. La terapia oral o parenteral con corticosteroides, puede inducir el parto en el último trimestre de gestación y puede inducir a un parto prematuro seguido por distocia, muerte fetal, retención de placenta y/o metritis. Puede producir también anomalías congénitas, así como paladar hendido, deformación en los miembros y anasarca. Su uso prolongado puede provocar Síndrome de Cushing iatrogénico y supresión del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, que en caso de suspensión brusca del tratamiento puede desencadenar una crisis Addisoniana.

## PRECAUCIONES:

Agitar antes de usar.

Previo administración intraarticular o intrasinoval, realizar una correcta asepsia en la zona y realizar las técnicas adecuadas.

En casos de terapias prolongadas reducir la dosis gradualmente antes de terminarla.

**NO UTILIZAR EN EQUINOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO.**

## CONSERVACIÓN Y VALIDEZ:

Conservar al reparo de la luz y a temperaturas entre 5 y 25°C.

Período de validez luego de fabricado 2 años

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de confección: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano. No dispersar en el medio ambiente.

Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

**PRESENTACIÓN:** frascos por 20 ml

Registro MGAP A- 4996

Director Técnico Dr. Rodolfo Meerhoff

Importa y distribuye FATRO FEDAGRO SRL Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20). Tel.: 22202336 – Montevideo – Uruguay

Fabrica Von Franken S.A.I.C. – Buenos Aires – Argentina

www.fatrofedagro.com.uy