

# CEFATRON Secado

## Cefapirina benzatínica

Pomada intramamaria para bovinos en período de secado



USO VETERINARIO

**Composición: Principio activo** Cefapirina 300 mg (eq. a Cefapirina benzatínica 390 mg) – **Excipientes:** c.s.p. 5 ml

Cefatron Secado es un preparado de una sal benzatínica de Cefapirina que presenta un amplio espectro de acción y tiene como característica ser resistente a la acción de las  $\beta$ lactamasas bacterianas. Entre los microorganismos responsables de la mastitis, la Cefapirina es particularmente activa frente a estafilococos, comprendidas cepas productoras de penicilinasas, *Streptococcus agalactiae* y *uberis*, *Escherichia coli* y *Actinomyces pyogenes*.

Cefatron Secado presenta una elevada y constante estabilidad, consistencia y fluidez a altas temperaturas ambiente; es bien tolerado, no irrita y no produce otro tipo de reacciones en la mama.

Cefatron Secado permanece en la mama por todo el período de secado y es eliminado con la siguiente lactación.

### Indicaciones:

Está indicado para vacas en el período de secado para terapia de las infecciones subclínicas existentes y para la prevención de posibles infecciones que puedan surgir en el período de reposo funcional de la glándula mamaria. El tratamiento reduce también el riesgo de mastitis subclínicas agudas que pueden aparecer con el parto al momento del inicio de la lactación.

### Posología y modalidad de uso:

Un pomo intramamario de Cefatron Secado por cuarto mamario después del último ordeño.

Ordeñar y escurrir completamente cada cuarto mamario, limpie y desinfecte el pezón (en particular el orificio del pezón). Sacar el tapón del pomo intramamario e introducir la punta de la cánula en el canal del pezón e inyectar el contenido completamente. Retirar la cánula, presionando con una mano el extremo del pezón y con la otra mano masajear con delicadeza hacia arriba el contenido en el conducto del pezón. Luego con ambas manos masajear con delicadeza hacia arriba el cuarto mamario de manera de difundir uniformemente el producto por toda la cisterna.

### Tiempo de espera:

**Carne y vísceras** 56 días

**Leche** 49 días desde su aplicación

**Contraindicaciones:** No administrar a animales con hipersensibilidad a las cefalosporinas. NO USAR EN BOVINOS EN LACTACIÓN.

**Reacciones adversas:** Ninguna señalada. Si se observan reacciones adversas graves u otras reacciones no mencionadas en este folleto explicativo, por favor informe a su Médico Veterinario.

**Precauciones:** La utilización de este medicamento debe ser sobre los resultados de un antibiograma. La utilización del producto con un fin diferente al que figura en este folleto explicativo, puede conducir a un aumento de la prevalencia de bacterias resistentes y reducir la eficacia por generación de resistencia cruzada.

**Cefatron Secado se utiliza durante el periodo de secado, NO usar durante la lactación.**

Las cefalosporinas pueden presentar antagonismo de acción con el uso de tetraciclina y macrólidos.

### Conservación:

Conservar al reparo de la luz y el calor, entre 5°C – 25°C.

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de confeccionamiento: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales. El envase del producto inutilizado o vencido, debe llevarse al centro de acopio más cercano. NO dispersar en el medio ambiente.

Fatro Fedagro SRL no se responsabiliza por el mal uso del producto.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
VENTA BAJO RECETA MÉDICA VETERINARIA**

### PRESENTACIÓN

Caja con 12 pomos de uso Intramario de 5 ml

**Registro M.G.A.P.: 2019A00673**

Importa y distribuye Fatro Fedagro S.R.L.

Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20). Tel.: 22202336

Fabrica FATRO S.p.a. – Bologna - Italia.

www.fatrofedagro.com.uy