

PARA EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA EN PERROS



Decongesta®
PIMOBENDAN

Un corazón feliz late por nuevas aventuras.

**LA TERAPIA TEMPRANA
ES IMPORTANTE:**

**RETARDA LOS SÍNTOMAS
Y DETIENE LA PROGRESIÓN
DE LA PATOLOGÍA CARDÍACA.**

Decongesta® está indicado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva en perros, causada por miocardiopatía dilatada o insuficiencia valvular (regurgitación de la válvula mitral y/o tricúspide).

**COMPRIMIDO DIVISIBLE
PARA UNA DOSIS
PERFECTA**



Fácil de masticar
para cualquier
tipo de
perro.

MASTICABLE

DOSIS
PRECISA

Dosis
adecuada
para cada
tamaño de perro.

ALTAMENTE
PALATABLE

Facilita
la terapia
a largo plazo.


Se fracciona
fácilmente en
partes iguales sin
desmenuzarse.

FÁCIL
DE DIVIDIR



LA SALUD DE LOS ANIMALES PARA LA SALUD DEL HOMBRE





PIMOBENDAN RESTABLECE
EL EQUILIBRIO HEMODINÁMICO

DOBLE MECANISMO

EFFECTO EN EL MIOCARDIO

AUMENTA LA FUERZA DE
CONTRACTILIDAD DEL MIOCARDIO
a través del aumento
de la sensibilidad al calcio.

AUMENTA EL GASTO CARDÍACO.

NO AFECTA EL CONSUMO
ENERGÉTICO MIOCARDÍACO.

EFFECTO VASCULAR

VASODILATACIÓN
ARTERIAL Y VENOSA
a través de la inhibición
de la fosfodiesterasa III.

POSOLÓGÍA

Decongesta® debe ser administrado por vía oral en un rango de dosis de 0,2-0,6 mg. de Pimobendan por kg. de peso vivo al día. La dosis diaria recomendada es de 0.5 mg/kg p.v., dividida en dos administraciones diarias (0.25 mg/kg p.v. cada una): una mitad de la dosis por la mañana y la otra mitad aproximadamente 12 horas después. Cada dosis debe administrarse aproximadamente 1 hora antes de la comida.

Decongesta® 1,25 mg: 50 tabletas palatables.

Decongesta® 5 mg: 50 tabletas palatables.

Decongesta® 10 mg: 50 tabletas palatables.

Peso animal (kg)	DECONGESTA 1,25 mg	DECONGESTA 5 mg	DECONGESTA 10 mg
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5	1	
10		2	1
15		3	
20		4	1
25		5	1
30		6	2
35		7	2
40		8	2
50			3
60			4

La tabla muestra la cantidad para cada administración única de **Decongesta®**, que corresponde aproximadamente a 0,25 mg de pimobendán/kg de peso corporal.

PIMOBENDAN, LA ELECCIÓN DE CONFIANZA DE LOS CARDIÓLOGOS

DECLARACIÓN DE CONSENSO ACVIM SOBRE LA INSUFICIENCIA VALVULAR




Perros con alto riesgo de desarrollar la patología pero que actualmente no tienen alteraciones estructurales cardíacas (por ejemplo, Cavalier King Charles Spaniel).



Perros asintomáticos sin evidencias radiográficas o ecocardiográficas de remodelación cardíaca.



Perros asintomáticos con una cardiopatía estructural, con un regurgitación hemodinámicamente grave, evidenciada por signos radiográficos y ecocardiográficos de remodelación cardíaca.



Perros que presentan o han presentado en el pasado signos de insuficiencia cardíaca relacionada con una patología cardíaca estructural.



Perros con una patología cardíaca terminal con signos clínicos de insuficiencia cardíaca, refractaria a las "terapias estándar".

ACVIM: American College of Veterinary Internal Medicine

FATROFEDAGRO.COM.UY

Seguinos en: FATROFEDAGRO

