



Alivios

flunixin meglumina

solución inyectable para bovinos, suinos y equinos
analgésico-antinflamatorio-antipirético

USO VETERINARIO

PROPIEDADES FARMACOLOGICAS

Farmacodinamia

El flunixin meglumina es un AINES (antinflamatorio no esteroideo) con propiedades analgésicas, no narcóticas y antipiréticas.

Actúa a través de la inhibición de la ciclo-oxigenasa con la consecuente reducción de la síntesis y liberación de prostaglandina, que es el mediador químico del dolor, la inflamación y la fiebre.

Farmacocinética

En el **bovino** a la dosis recomendada de 2,2 mg de Alivios/kg p.v. por vía endovenosa, la concentración máxima en sangre es de 14,9 µgr (microgramos)/ml a los 10 min. de la administración; y disminuye gradualmente hasta el rango de 0,1 µgr/ml a las 24 horas después del tratamiento.

La vida media plasmática del producto luego de la administración de 0,25 mg/kg p.v. por vía intramuscular, es de 3 horas.

En el **suino** la administración de Alivios es de 1,0 mg/kg de p.v. por vía intramuscular.

La concentración máxima en sangre se obtiene dentro de los 15 min. de su administración y a las 24 hs solo quedan trazas de la misma. A las 72 hs de la administración el 57% de flunixin aparece en orina y el 20% en fecas.

En el **equino** la dosis es de 1,1 mg/kg p.v. por vía intramuscular, el producto es eficaz a las 2 hs de la administración y la actividad máxima es entre las 12-16 hs y perdurando a nivel terapéutico por 24 a 36 hs.

COMPOSICION

1 ml contiene: **Principio activo:** flunixin meglumina 82,95 mg equivalente a flunixin 50 mg.

Excipientes: agua p.p.i., c.s.p. 1 ml.

INDICACIONES, POSOLOGIA, Y MODALIDAD DE USO

- Alivios está indicado en la terapia analgésica, antinflamatoria y antipirética. Según la afección puede ser usado solo o como coadyuvante de la terapia etiológica antibiótica o metabólica.

- Administrar por vía intramuscular o endovenosa lenta.

Bovinos

Enfermedades agudas del aparato respiratorio (parasitarias, virales y bacterianas), fiebre y síndrome doloroso:

2 ml/45 kg p.v. (2,2 mg/kg p.v.); preferentemente por vía endovenosa en una única administración diaria, repitiendo no mas de 3 días consecutivos, y mientras tanto realizar la terapia etiológica.

Si se utiliza como analgésico se puede administrar 1 o 2 veces con diferencia de 12 hs.

Suinos

Síndrome MMA (mastitis, metritis, agalactia) en hembras, shock endotóxico del lechón:

2 ml/45 kg p.v. (2,2 mg/kg p.v.) por vía intramuscular profunda en una única dosis.

Si es necesario en el síndrome MMA repetir la dosis a las 12 horas.

Equinos

Afecciones músculo-esqueléticas:

1 ml/45 kg p.v. (1,1 mg/kg p.v.) una vez al día y no mas de 5 días consecutivos.

En el caso de cólicos 1 ml/45 kg p.v. (1,1 mg/kg p.v.) 1 o 2 veces cuando los síntomas persisten.

La vía endovenosa es recomendada para obtener una respuesta mas rápida.

CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS INDESEADOS

El uso de AINES está contraindicado en casos de patología gastroentérica (en particular en lesiones ulcerativas), insuficiencia renal, hepática, cardíaca y en sujetos con sangrado activo.

- No utilizar si existe evidencia de discrasia hemática.

- No utilizar en animales con hipersensibilidad a flunixin meglumina, otros AINES y cualquier otro componente del producto.

- No utilizar en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos.

- No utilizar en animales con disfunción músculo esqueléticas crónicas.

- No utilizar la vía arterial, si ocurriera accidentalmente, se puede observar: ataxia, incoordinación, hiperventilación, temblores y debilidad muscular.

Estos síntomas son pasajeros y desaparecen en pocos minutos sin la administración de un antídoto.

- No superar la dosis y la duración del tratamiento aconsejados.

La utilización en cualquier animal menor a 6 semanas de edad (bovinos, equinos) o en animales añosos, puede implicar un riesgo mayor.

Si el empleo no puede ser evitado, utilizar una dosis menor y mantener el animal cuidadosamente monitoreado.

- No mezclar Alivios con otros medicamentos.

La administración junto con corticoides puede incrementar la toxicidad de ambos fármacos, aumentando el riesgo de ulceración gastrointestinal. Algunos fármacos antiinflamatorios pueden ligarse a las proteínas plasmáticas y competir con otros medicamentos con las mismas características produciendo efectos tóxicos.

El flunixin puede reducir el efecto de algunos medicamentos antihipertensivos inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas, como diuréticos, inhibidores ACE, alfa y beta bloqueantes.

Debe evitarse la administración junto con medicamentos nefrotóxicos como los amino-glucósidos, dado que el flunixin puede reducir la eliminación renal de los mismos.

DURANTE GESTACION Y LACTANCIA

Alivios esta indicado durante la lactación.

No está evaluado su efecto durante la gravidez de la yegua y cerda. No se han observado efectos patológicos en el bovino ni animales de laboratorio.

El empleo durante la gravidez y lactancia de la yegua y cerda queda subordinado a la evaluación de riesgo/beneficio por parte de médico veterinario.

Como todos los AINES, en todas las especies no es aconsejable usarlo al término de la gestación dado que puede interferir con el mecanismo del parto.

TIEMPO DE ESPERA

Bovinos: carne 7 días, leche 24 horas.

Suinos: 18 días.

Equinos: 7 días.

VALIDEZ

2 años a partir de la fecha de elaboración y 28 días a partir de apertura del frasco.

CONSERVACION

Conservar a reparo de la luz a temperaturas entre 5 y 25°C.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACION DEL PRODUCTO INUTILIZADO Y/O DEL MATERIAL DE CONFECCIONAMIENTO

El producto vencido, inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales; descartar envases utilizados o vencidos en los centros de acopio, no dispersar en el medio ambiente.

Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.

Mantener fuera del alcance de los niños

PRESENTACION

Frasco de 100 ml.

MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

Director Técnico: Dr. R. Meerhoff

Registro MGAP A-4353

Importa y distribuye:

Fatro Fedagro S.R.L.

Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601.

Tel.: 22202336

Montevideo - Uruguay

Fabricado por:

FATRO S.p.A.

Industria Veterinario-Farmacéutica

Via Emilia, 285

Ozzano Emilia (Bologna) Italia

Se declara que el establecimiento elaborador de Fatro respeta las normas de Buena Fabricación (Good Manufacturing Practices) sugeridas por la Organización Mundial de la Sanidad, así como la normativa europea y nacional en materia de producción de fármacos.