CRIPTOLAT

(Cabergolina)

CRIPTOLAT, 50µg/ml, solución oral para el perro y gato

USO VETERINARIO

- **Composición:**

1 ml contiene: Principio activo: cabergolina 50 µg. Excipientes: triglicéridos saturados de cadena media c.s.p. para 1 ml.

- **Indicaciones:**

Para el tratamiento de la pseudopreñez (pseudociesis) de la perra: La inhibición de la secreción de prolactina por la cabergolina, produce una rápida resolución de de las manifestaciones de la pseudogravidez (lactación y comportamiento anómalo).
Supresión de la lactación en la perra y gata: la supresión de la producción láctea en la perra y gata puede ser necesaria si se desteta en forma temprana a los cachorros o luego de sacar a los cachorros inmediatamente después del parto. La inhibición de la liberación de prolactina se traduce en una rápida cesación de la lactación y en consecuencia en una reducción del tamaño de las mamas. La suspensión de la secreción láctea puede prevenir la aparición de complicaciones posteriores de la mama (mastitis).
Como coadyuvante en la terapia de la eclampsia y de la mastitis con secreción láctea que tiene lugar en la perra y en la gata.

- **Especies de destino**: Perra y gata

- **Posología por especie, vía y modalidad de administración:**

CRIPTOLAT puede ser administrada por vía oral directamente en la boca del animal o mezclado con el alimento.
Perra: 0.1 ml/kg p.v. (equivalente a 5µg/Kg p.v.) una vez al día por 4-6 días en función de la gravedad del cuadro clínico.
Gata: 05-1 ml/animal una vez al día por 4-6 días en función de la gravedad del cuadro clínico.
Si se verifican fenómenos de recaída, los animales pueden ser tratados nuevamente de acuerdo a lo antes descripto. El producto debe ser usado bajo supervisión del veterinario.

- **Contraindicaciones:**

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes. No usar durante la preñez dado que puede causar aborto. No utilizar junto con antagonista de la dopamina.
La Cabergolina puede inducir hipotensión transitoria. No usar en animales tratados con fármacos hipotensores. No utilizar inmediatamente de una intervención quirúrgica si los animales se encuentran aún bajo efecto de la anestesia.

- **Reacciones adversas:**

En la casuística se ha visto que algunos sujetos han registrados fenómenos de vómitos dentro de la 1-2 horas a la primera administración. La terapia no debe ser interrumpida por tal fenómeno, dado que normalmente no se verifica luego de administraciones posteriores.
Emesis o náuseas luego de 2 horas de la administración no se deben al producto.
Durante el tratamiento se puede verificar una ligera inapetencia. En casos raros se pueden observar signos neurológicos como somnolencia, temblores musculares, ataxia, hiperactividad y convulsiones. De observarse manifestaciones adversas graves u otras reacciones no mencionadas en este folleto ilustrativo, se debe informar al médico veterinario.

- **Advertencias especiales:**

En las especies de destino: Administrar con cautela en animales con patologías cardiovasculares, enfermedades hepáticas, insuficiencia renal, úlcera péptica o hemorragia intestinal. Antes de la administración se debe verificar que las hembras no estén gestando.
En las personas que administran el producto: Aquellas personas con hipersensibilidad a los principios activos del producto, deben evitar su contacto directo. Evitar el contacto con la piel u ojos. Durante el embarazo o en edad de desarrollo administrar con cautela.
En caso de sobredosificación el primer síntoma en aparecer es el vomito.
No administrar junto con otros medicamentos

- **Precauciones para su conservación:**

Conservar a temperaturas entre 2 y 25ºC.
Período de validez luego de fabricado 3 años
Período de validez luego de la apertura del producto 12 días.

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de confeccionamiento: el producto vencido, inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales; llevar al centro de acopio más cercano. No dispersar en el medio ambiente.
Fatro Fedagro S.R.L. no se responsabiliza por el mal uso del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MEDICA VETERINARIA

Presentación:
Frascos de 15 ml + jeringa graduada de 3 ml (animales de hasta 25 Kg p.v.)
Registro M.G.A.P.: A – 5385
Dir. Técnico Dr. R. Meerhoff
Importa y distribuye Fatro Fedagro S.R.L.
Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20). Tel.: 22202336 – Montevideo - Uruguay
Fabrica FATRO S.p.A. – Bologna - Italia.
www.fatrofedagro.com.uy

Control marzo 2018