

# DISPOCEL MONO USO

Dispositivos intravaginales con 0.6 gr de progesterona



**USO VETERINARIO**

## INDICACIONES:

Regulación del ciclo estral en vacas y vaquillonas. Programas de inseminación a tiempo fijo (ITAF) o con detección de celo. Programas de transferencia embrionaria. Al ser colocado produce una elevación de P4 en sangre que continua hasta su retiro a los 7 u 8 días. Al extraer el dispositivo, la caída abrupta de P4 en sangre produce una sincronización de los ciclos estrales de las hembras bajo tratamiento.

**COMPOSICIÓN:** Progesterona 0.6 gramos, silicona inerte c.s.p.

## ESPECIES, VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vacas y Vaquillonas.

Administrar un dispositivo por hembra mediante el aplicador intravaginal según las instrucciones del prospecto.

Ver programas de uso para IATF.

**TIEMPO DE ESPERA:** Carne y leche: 0 días

## OBSERVACIONES:

Lavar y desinfectar la zona perineal, previa aplicación.

Lavar y desinfectar el aplicador luego de cada aplicación.

**CONSERVACIÓN:** Mantener a temperaturas entre 5 y 30°C al reparo de la luz.

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de confeccionamiento: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano. No dispersar en el medio ambiente.

Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

## PRESENTACIÓN:

Bolsa con 10 dispositivos intravaginales de monouso

Registro MGAP A-4839

**Director Técnico:** Dr. Rodolfo Meerhoff

Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20). Tel.: 22202336 – Montevideo - Uruguay

Fabrica Fatro Von Franken SAIC – Buenos Aires – Argentina

[www.fatrofedagro.com.uy](http://www.fatrofedagro.com.uy)

# DISPOCEL MONO USO

Dispositivos intravaginales con 0.6 gr de progesterona



**USO VETERINARIO**

## INDICACIONES:

Regulación del ciclo estral en vacas y vaquillonas. Programas de inseminación a tiempo fijo (ITAF) o con detección de celo. Programas de transferencia embrionaria. Al ser colocado produce una elevación de P4 en sangre que continua hasta su retiro a los 7 u 8 días. Al extraer el dispositivo, la caída abrupta de P4 en sangre produce una sincronización de los ciclos estrales de las hembras bajo tratamiento.

**COMPOSICIÓN:** Progesterona 0.6 gramos, silicona inerte c.s.p.

## ESPECIES, VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vacas y Vaquillonas.

Administrar un dispositivo por hembra mediante el aplicador intravaginal según las instrucciones del prospecto.

Ver programas de uso para IATF.

**TIEMPO DE ESPERA:** Carne y leche: 0 días

## OBSERVACIONES:

Lavar y desinfectar la zona perineal, previa aplicación.

Lavar y desinfectar el aplicador luego de cada aplicación.

**CONSERVACIÓN:** Mantener a temperaturas entre 5 y 30°C al reparo de la luz.

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de confeccionamiento: el producto inutilizado y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano. No dispersar en el medio ambiente.

Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

## PRESENTACIÓN:

Bolsa con 10 dispositivos intravaginales de monouso

Registro MGAP A-4839

**Director Técnico:** Dr. Rodolfo Meerhoff

Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20). Tel.: 22202336 – Montevideo - Uruguay

Fabrica Fatro Von Franken SAIC – Buenos Aires – Argentina

[www.fatrofedagro.com.uy](http://www.fatrofedagro.com.uy)