



Fatroximín Spray Topico

rifaximina

COMPOSICION - Un tubo spray de 200 ml contiene:

Principio activo: Rifaximina 0.5 gr - **Excipientes y propelente:** c.s.p. 142 gr.

CARACTERISTICAS - FATROXIMIN SPRAY TOPICO es un preparado de Rifaximina, antibiótico de síntesis perteneciente a la familia de las ansamicinas. El mecanismo de acción es por interacción con el ARN-polimerasa DNA-dependiente, con el consecuente bloqueo de la síntesis proteica. FATROXIMIN SPRAY TOPICO presenta una actividad antibacteriana del tipo bactericida en confrontación con microorganismos Gram positivos aeróbicos y anaeróbicos y algunos Gram negativos. Estudios farmacocinéticos de la Rifaximina en administración cutánea, han puesto en evidencia la ausencia de residuos en el plasma, músculo, y grasa subcutánea de los animales tratados.

INDICACIONES - FATROXIMIN SPRAY TOPICO está indicado en bovinos, ovinos, caprinos, suinos, perros y gatos para la prevención y terapia de las infecciones de la piel y anexos, en particular en los casos de piéтин, dermatitis interdigital, lesiones podales en general, piodermitis, abrasiones, úlceras, grietas, heridas post operatorias y traumáticas.

ESPECIES DESTINADAS

Bovinos, ovinos, caprinos, suinos, equinos, caninos y felinos.

Lote
Fab.
Venc.



Fatroximín Spray Topico

rifaximina

POSOLOGIA Y MODO DE USO - Agitar previo a su uso. En todos los casos está recomendado, limpiar la zona antes de proceder al uso de FATROXIMIN SPRAY TOPICO y proceder a la irrigación del producto en toda la zona afectada. En los casos que haya tejido necrótico, proceder primero a la remoción del mismo.

En las afecciones leves se puede aplicar FATROXIMIN SPRAY TOPICO una sola vez, pero en las afecciones graves se repite diariamente hasta la curación completa de la herida. En todos los casos se obtiene un mejor resultado precediendo a realizar 2 aplicaciones en la zona afectada, con intervalo de poco segundos entre una y otra, durante 3-5 días.

CONTRAINDICACIONES - No administrar en animales con hipersensibilidad a la Rifaximina o cualquiera de sus excipientes.

ADVERTENCIAS ESPECIALES - No perforar. No posee gas propelente que dañe la capa de ozono.

No inhalar y evitar el contacto con ojos y otras mucosas, de ocurrir lavar con abundante agua. Mantener alejado de fuentes inflamables y no aplicar cerca de fuego en llama o material incandescente. Se puede utilizar en la gravidez y lactación. No se han observado síntomas de sobredosificación.

REACCIONES ADVERSAS - Ninguna. De observar reacciones adversas graves u otras reacciones no mencionadas en este prospecto, informe a su médico veterinario.

TIEMPO DE ESPERA - Carne y leche: 0 días.

CONSERVACION - A temperaturas entre 5 y 25 °C al reparo de la luz y calor. Período de validez luego de su fabricación 3 años. No usar luego de la fecha de vencimiento.

Descartar envases utilizados o vencidos en los centros de acopio, no dispersar en el medio ambiente.

Mantener fuera del alcance de los niños

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

PRESENTACION - Envase x 142 gr.

Registro MGAP A-1961

Director Técnico Dr. Rodolfo Meerhoff

Importa y distribuye:

Fatro Fedagro S.R.L.
Ruta 8 Gral. Lavalleja N° 10601
Tel.: 22202336
Montevideo - Uruguay

Fabricado por:

FATRO S.p.A.
Industria Veterinario-Farmacéutica
Via Emilia, 285 - Ozzano Emilia
(Bologna) Italia



7 730902 430836