

MICOSPECTONE

50mg/ml + 100 mg/ml



USO VETERINARIO

Micospectone, es una **asociación de Lincomicina** (antibiótico de la familia lincosamida) y **Espectinomicina** (antibiótico aminociclitolico) en relación 1:2. Ambos principios activos inhiben la síntesis proteica: la Lincomicina mediante la unión con la subunidad ribosomial 50 S, mientras que la Espectinomicina con la subunidad 30 S. En cuanto a la actividad farmacológica, la Lincomicina presenta un espectro de acción dirigido principalmente contra bacterias Gram-positivas y micoplasmas. El espectro de acción de la Espectinomicina es más amplio que el de Lincomicina y abarca mayormente bacterias Gram-negativas, algunas Gram-positivas y los micoplasmas.

La utilización simultánea de ambos principios activos, permite experimentar una fuerte acción sinérgica frente a numerosos agentes bacterianos, incluyendo micoplasmas. Después de la administración intramuscular, la Lincomicina se absorbe rápidamente y, ligándose escasamente (5-20%) a las proteínas plasmáticas. Difunde por todos los órganos y tejidos en los cuales alcanza concentraciones superiores a las hemáticas. En el caso de la administración oral, se absorbe rápidamente, pero en forma parcial (20-35%). La eliminación de la Lincomicina administrada por vía parenteral se elimina preferentemente por vía hepato-biliar y en menor parte (20%) por excreción renal, mientras que luego de la administración oral, la excreción urinaria decrece (10%) y aumenta la hepato-biliar. La Espectinomicina es rápidamente absorbida luego de la administración intramuscular, mientras que cuando es administrada por vía oral, permanece cerca del 90% a nivel gastroentérico. La capacidad de la Espectinomicina de difundir a los tejidos resulta escasa y se distribuye principalmente en los compartimientos vasculares y extravasculares. Luego de la administración parenteral es eliminada mayormente (87-95%) con la orina en forma inmodificada, mientras que en el caso de la administración oral la parte no absorbida se elimina con las fecas.

• COMPOSICIÓN:

SOLUCIÓN INYECTABLE:

1 ml. contiene: **Principio activo:** Lincomicina clorhidrato 56.7 mg. (equivalente a Lincomicina 50 mg.) – Espectinomicina clorhidrato 150 mg. (equivalente a Espectinomicina 100 mg.) – **Excipientes:** Agua p.p.i. y otros en c.s.p. 1 ml.

POLVO SOLUBLE PARA USO ORAL:

100gr. de polvo contiene: **Principio activo:** Lincomicina clorhidrato 18.9gr. (equivalente a Lincomicina 16.65gr) – Espectinomicina clorhidrato 49.71 gr., (equivalente a Espectinomicina 33.35gr.) – **Excipientes:** Lactosa c.s.p. 100 gr.

• INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Micospectone está indicado para el tratamiento de las infecciones causadas por Bacterias Gram-positivas, Gram-negativas y micoplasmas sensibles a la Lincomicina y Espectinomicina. En particular *Estafilococos*, *Streptococos*, *Diplococos*, *Corynebacterium*, *Bacilos*, *Clostridios*, *Coliformes*, *Klebsiellas*, *Salmonellas*, *Haemophilus*, *Brucellas*, *Pasteurellas*, *Leptospiras*, *Bordetellas*, *Coccidias*, *Campylobacter*, *Fusobacterium*, *Treponemas*, *Micoplasmas*.

Bovinos, Ovinos, Caprinos: enfermedades respiratorias y entéricas, infecciones podales, mastitis, clostridiosis y micoplasmosis.

Suinos: enfermedades respiratorias bacterianas y por micoplasmas, disentería hemorrágica, enteritis bacteriana, artritis séptica, pulmonía por *Haemophilus spp.*

Aves: *micoplasma* y *M.C.R.*

• CONTRAINDICACIONES - REACCIONES ADVERSAS:

- No usar en casos de hipersensibilidad conocida a cualquiera de los principios activos o cualquiera de los excipientes
- No usar el producto si se usa simultáneamente miorrelajantes
- El uso del producto en especies de animales distintas a aquellas indicadas en la etiqueta, puede provocar efectos colaterales, especialmente a nivel gastroentérico, no usar en equinos, conejos y gallinas para la ovoposición.
- El uso de un antibiótico como Micospectone puede inducir ocasionalmente el desarrollo de microorganismos resistentes, tales como levaduras, en cuyo caso se deben tomar contramedidas adecuadas.

- Se pueden observar en casos ocasionales de diarrea transitoria en ovino, caprino y suinos, enseguida de la administración del producto.
- En la cabra puede observarse pérdida de apetito y disminución de la producción láctea.
- Raramente se observan casos de abortos y/o muerte en la cerda tratada en el último tercio de preñez.
- Se pueden llegar a observar reacciones de inflamación en el punto de inoculación.
- De observarse reacciones alérgicas graves u otras alteraciones no mencionadas en este folleto ilustrativo, informe a su veterinario.

• POSOLOGÍA:

Administrar por **vía intramuscular profunda** y en más de un punto de inoculación.

SOLUCIÓN INYECTABLE:

- Bovinos, Ovinos, Caprinos: 1 ml/10Kg. de p.v. cada 12 - 24 hs por 2 a 4 días.

- Suinos: 1ml/10Kg. de p.v. cada 24 hs. por 2 a 4 días.

POLVO SOLUBLE PARA USO ORAL:

-Pollos: Primeras 3 semanas 3gr/10Kg. de p.v. por 3 días. Luego de la tercera semana 1 gr/10Kg. de p.v. por 3 días.

-Terneros: 6gr/10Kg. de p.v. en dos administraciones.

-Lechones: 0.3gr/10Kg. de p.v.

• ADVERTENCIAS:

- La solución preparada con polvo soluble de uso oral en agua potable, es estable a temperatura ambiente por 48 hs. en envase cerrado y mantenido al amparo de la luz.

- La especialidad no debe ser administrada en equinos, conejos y gallinas en postura.

- La forma oral está contraindicada en rumiantes con rumen funcional.

• CONSERVACIÓN: Conservar a temperaturas entre 5 y 25°C al reparo de la luz.

• TIEMPO DE ESPERA:

Carne: 14 días (excluidos pollos)

Leche: 48 hs.

Pollos: 7 días.

• VALIDEZ: 30 meses a partir de su confeccionamiento

Precauciones especiales para la eliminación del producto inutilizado y/o del material de confección: el producto inutilizado o vencido y el contenido deben ser eliminados según las disposiciones legales nacionales. Eliminar/depositar en el centro de acopio más cercano. No dispersar en el medio ambiente.

Fatro Fedagro no se responsabiliza por el mal uso del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

VENTA BAJO RECETA VETERINARIA

PRESENTACIÓN

SOLUCIÓN INYECTABLE: frasco de 100 y 250 ml

Micospectone inyectable Registro M.G.A.P.: A-2092

POLVO SOLUBLE DE USO ORAL: sobres de 10 y 250 gr

Registro M.G.A.P.: A-1862

Dir. Tec.: Dr. Rodolfo Meerhoff

Importa y distribuye Fatro Fedagro S.R.L.

Ruta 8 Brig. Gral. Juan A. Lavalleja N° 10601 (Km 20). Tel.: 22202336

Fabrica FATRO S.p.A. – Bologna - Italia.

www.fatrofedagro.com.uy